

CTM – Chapitre B Exercices**Avancement et constante d'équilibre****Exercice : Taux d'avancement**

Dans un litre d'eau, on mélange initialement :

$$\left\{ \begin{array}{l} 0,02 \text{ mol d'ions méthanoate } \text{HCO}_3^- \\ 0,02 \text{ mol d'acide nitreux } \text{HNO}_2 \\ 0,01 \text{ mol d'acide méthanoïque } \text{HCOOH} \\ 0,01 \text{ mol d'ions nitrite } \text{NO}_3^- \end{array} \right.$$

L'équation-bilan qui symbolise la réaction chimique qui modélise les transformations chimiques dans le système est :




il s'agit d'une réaction acido-basique entre les couples $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ et $\text{HNO}_2/\text{NO}_3^-$ dont la constante thermodynamique d'équilibre est $K^\circ(T) = 2,80$ à $T = 25^\circ\text{C}$.

1. Établir un tableau d'avancement *littéral* pour cette réaction avec deux lignes : état initial et état final.
2. Déterminer le sens d'avancement de la réaction.
3. Déterminer l'avancement maximal ξ_{\max} .
4. Déterminer l'avancement final ξ_f .
5. Déterminer la composition finale de la solution, c'est-à-dire les quantités de matière de chaque espèce.
6. Déterminer le taux d'avancement final de la réaction, noté τ , tel que $\tau = \frac{\xi_f}{\xi_{\max}}$.

Exercice : Calcul de constante

On considère une réaction dont l'équation-bilan est :



À la température T , et à la pression totale $p = 4,0 \text{ bar}$, on mesure, à l'équilibre :

$$\left\{ \begin{array}{rcl} n_{\text{HCl,éq}} & = & 0,30 \text{ mol} \\ n_{\text{O}_2,\text{éq}} & = & 0,012 \text{ mol} \\ n_{\text{H}_2\text{O,éq}} & = & 0,45 \text{ mol} \\ n_{\text{Cl}_2,\text{éq}} & = & 0,72 \text{ mol} \end{array} \right.$$

1. Déterminer les pressions partielles à l'équilibre de chaque espèce.
2. Déterminer la valeur de $K^\circ(T)$.